

Informace pro pacienty léčené tyreostatikou (Thyrozol nebo Propycil)

Autoři: **MUDr. Jan Krátký, Ph.D., MUDr. Mikuláš Kosák, Ph.D.,
doc. MUDr. Jan Jiskra, Ph.D.**

Tento text obsahuje stručnou informaci o možných nežádoucích účincích léků užívaných k terapii tyreotoxikózy (Thyrozol nebo Propycil). **Léčba těmito léky je bezpečná a výskyt závažných nežádoucích účinků je vzácný.** Nejčastěji se objeví v prvních 3 měsících léčby. Pokud budete mít po přečtení tohoto letáku nějaké dotazy či obavy, obraťte se na svého ošetřujícího endokrinologa.

Možné nežádoucí účinky Thyrozolu a Propycilu:

Porucha tvorby bílých krvinek (agranulocytóza)

Léčba tyreostatikou může vzácně (asi 0,1 - 0,5 % léčených pacientů) vést k poruše tvorby bílých krvinek, velmi vzácně krevních destiček. K typickým příznakům patří: **horečka, bolest v krku, vředy v dutině ústní, krvácení v různých částech těla, zvýšená tvorba modřin.** Pokud se u vás jeden nebo více z těchto příznaků objeví, je třeba ihned vyhledat lékařskou pomoc, provést odběr krve na krevní obraz a přerušit tyreostatiku. Když se porucha bílých krvinek potvrdí, je nutné co nejdříve kontaktovat ošetřujícího endokrinologa. V případě normálního výsledku je třeba v léčbě tyreostatikou pokračovat.

Porucha funkce jater (hepatopatie)

Léčba tyreostatikou může také vzácně narušit funkci jater. K typickým příznakům patří: **žloutenka (tmavě žluté zbarvení kůže a očního bělma), bolest či tlak v pravém podžebří, tmavá moč a světlá stolice.** Pokud se u vás jeden nebo více těchto příznaků objeví, je třeba ihned vyhledat lékařskou pomoc, provést odběr krve na jaterní testy a přerušit tyreostatiku. Když se porucha jaterních testů potvrdí, je nutné co nejdříve kontaktovat ošetřujícího endokrinologa. V případě normálního výsledku je třeba v léčbě tyreostatikou pokračovat.

Vrozené vývojové vady v těhotenství

I když celkové riziko není o mnoho vyšší než v běžné populaci, může být léčba tyreostatikou v 1. trimestru těhotenství spojena s vyšším výskytem vrozených vývojových vad plodu. Proto je vždy vhodné těhotenství plánovat až po vyřešení tyreotoxikózy a do té doby používat účinnou antikoncepci. Pokud v průběhu léčby tyreostatikou neplánovaně otěhotníte, ihned kontaktujte svého ošetřujícího endokrinologa. Bude pravděpodobně nutné léčbu upravit s cílem minimalizovat riziko pro plod. Také budou nutné pravidelné kontroly funkce štítné žlázy v průběhu gravidity.

Kožní alergické reakce

Kožní alergické reakce mohou být naopak častější. Jedná-li se o lehkou reakci, není nutné tyreostatiku přerušovat. Ke zmírnění obtíží lze do terapie přidat protialergické léky („antihistaminika“). Jejich předpis Vám může zajistit praktický lékař. Těžká alergická reakce je samozřejmě důvodem k ukončení/změně léčby. V tom případě kontaktujte svého ošetřujícího endokrinologa.